

	Oclusión de la arteria central de la retina	Neuropatía óptica anterior	Neuropatía óptica posterior	Ceguera cortical
Procedimientos asociados	Cirugía en decúbito prono. Cirugía de cabeza y cuello.	Cirugía cardiaca Cirugía en decúbito prono. Otros (prostatectomía, cirugía vascular mayor, liposucción, síndrome compartimental abdominal)	Cirugía en decúbito prono. Cirugía de cabeza y cuello. Cirugía cardiaca	Cirugía cardiaca Cirugía ortopédica mayor. Cirugías hipotensión severa prolongada
Comienzo de los Síntomas	Inmediato	Puede ser inmediato, pero suele aparecer después del primer día del postoperatorio	Inmediato	Inmediato
Afectación visual	Unilateral	BILATERAL	Bilateral	Defectos de campos visuales bilaterales
Reflejo pupilar	Ausente o muy lento Defecto pupilar aferente relativo si unilateral.	Ausente o muy lento Defecto pupilar aferente relativo si unilateral.	Ausente o muy lento Defecto pupilar aferente relativo si unilateral.	Normal, nunca se asocia con defecto pupilar aferente relativo
Campos visuales	Severa, pérdida completa de visión	Defectos altitudinales Escotoma central Pérdida completa de visión	Defectos altitudinales Escotoma central Pérdida completa de visión	Hemianopsia homónima. Pérdida completa de visión.
Examen fundoscópico precoz	Fondo de ojo opaco y pálido con una fovea roja y atenuación de las arterias.	Disco del nervio optico edematoso	Normal	Normal
Examen Fundoscópico Tardío	Si se recanaliza, estrechamiento arterias retinianas, palidez del nervio óptico, posible neovascularización	Palidez del disco optico; retina normal con arteriolas atenuadas	Palidez del disco óptico; retina normal con arteriolas atenuadas	Normal
Recuperación	Escasa	Escasa	Escasa	Escasa
Tratamiento Efectivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Factores predisponentes	Compresión globo ocular. Émbolos Hipotensión	Sexo masculino, obesidad, utilización de trineo, gran pérdida hemática, duración de la intervención prolongada, excesivo uso de cristaloides y pocos coloides		